

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019**
Α΄ ΦΑΣΗ**E_3.Μλ2Θ(α)**

ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ημερομηνία: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**ΘΕΜΑ Α**

- A1.** Σχολικό βιβλίο σελίδα 25 παράγραφος 1.3
A2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 41 παράγραφος 1.5
A3. i. Λάθος ii. Σωστό iii. Σωστό iv. Σωστό v. Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1. $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sin(\widehat{\vec{\alpha}, \vec{\beta}}) \Rightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 1$

B2. Κάνοντας πράξεις στην σχέση $(\vec{\beta} + \lambda \vec{\alpha})(\lambda \vec{\beta} - \vec{\alpha}) = 3$ έχουμε:

$$(\vec{\beta} + \lambda \vec{\alpha})(\lambda \vec{\beta} - \vec{\alpha}) = 3 \Leftrightarrow \lambda \vec{\beta}^2 - \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \lambda^2 \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} - \lambda \vec{\alpha}^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow \lambda |\vec{\beta}|^2 - \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \lambda^2 \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} - \lambda |\vec{\alpha}|^2 = 3 \Leftrightarrow 4\lambda - 1 + \lambda^2 - \lambda = 3$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ ή } \lambda = -4$$

B3. Η τετμημένη του διανύσματος $\vec{x}$ είναι: $\vec{\alpha}(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = \vec{\alpha}^2 + \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 1 + 1 = 2$

Η τεταγμένη του διανύσματος $\vec{x}$ είναι: $\vec{\beta}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = 2\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} - \vec{\beta}^2 = 2 - 4 = -2$

Με βάση τα παραπάνω το διάνυσμα $\vec{x}$ είναι: $\vec{x} = (2, -2)$

$\lambda_{\vec{x}} = \frac{-2}{2} = -1$ αν ω η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{x}$ με τον άξονα $x'x$

τότε $\cos \omega = -1$ άρα $\omega = 135^\circ$ ή $\omega = 315^\circ$

Επειδή το διάνυσμα $\vec{x} = (2, -2)$ βρίσκεται στο 4^ο τεταρτημόριο η ζητούμενη γωνία είναι η $\omega = 315^\circ$

B4. Βρίσκουμε τα μέτρα των διανυσμάτων $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και $2\vec{\alpha} + \vec{\beta}$

$$|\vec{\alpha} - \vec{\beta}|^2 = (\vec{\alpha} - \vec{\beta})^2 = \vec{\alpha}^2 - 2\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta}^2 = 1 - 2 + 4 = 3 \text{ άρα } |\vec{\alpha} - \vec{\beta}| = \sqrt{3}$$

$$|2\vec{\alpha} + \vec{\beta}|^2 = (2\vec{\alpha} + \vec{\beta})^2 = 4\vec{\alpha}^2 + 4\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta}^2 = 4 + 4 + 4 = 12 \text{ άρα } |2\vec{\alpha} + \vec{\beta}| = 2\sqrt{3}$$

Επομένως έχουμε:

$$\vec{u} = |\vec{\alpha} - \vec{\beta}|\vec{\beta} + |2\vec{\alpha} + \vec{\beta}|\vec{\alpha} \Leftrightarrow \vec{u} = \sqrt{3}\vec{\beta} + 2\sqrt{3}\vec{\alpha}$$

και

$$\vec{v} = |\vec{\alpha} - \vec{\beta}|\vec{\beta} - |2\vec{\alpha} + \vec{\beta}|\vec{\alpha} \Leftrightarrow \vec{v} = \sqrt{3}\vec{\beta} - 2\sqrt{3}\vec{\alpha}$$


$$\text{Άρα } \vec{u} \cdot \vec{v} = (\sqrt{3}\vec{\beta} + 2\sqrt{3}\vec{\alpha}) \cdot (\sqrt{3}\vec{\beta} - 2\sqrt{3}\vec{\alpha}) = (\sqrt{3}\vec{\beta})^2 - (2\sqrt{3}\vec{\alpha})^2 = 12 - 12 = 0$$

Οπότε τα διανύσματα $\vec{u}, \vec{v}$ είναι κάθετα.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Με βάση το διπλανό σχήμα έχουμε:

$$A\left(|\vec{\beta}|, \frac{|\vec{\alpha}|}{\sqrt{2}}\right) \text{ άρα } \overrightarrow{OA} = \vec{\alpha} = \left(|\vec{\beta}|, \frac{|\vec{\alpha}|}{\sqrt{2}}\right)$$



$$\text{Ισχύει } (AB) = (OE) = |\vec{\beta}| \text{ και}$$

$$OE \parallel AB \text{ άρα } \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{AB} = \vec{\beta} \text{ και επειδή } \overrightarrow{OE} = (|\vec{\beta}|, 0) \text{ άρα } \vec{\beta} = (|\vec{\beta}|, 0)$$

$$\text{Ισχύει: } \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 4 \Leftrightarrow |\vec{\beta}| \cdot |\vec{\beta}| + \frac{|\vec{\alpha}|}{\sqrt{2}} \cdot 0 = 4 \Leftrightarrow |\vec{\beta}|^2 = 4 \Leftrightarrow |\vec{\beta}| = 2$$

Επίσης $\widehat{OAE} = 45^\circ$ άρα το τρίγωνο OAE ορθογώνιο και ισοσκελές επομένως

$$(OE) = (AE) \Leftrightarrow |\vec{\beta}| = \frac{|\vec{\alpha}|}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 2 = \frac{|\vec{\alpha}|}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow |\vec{\alpha}| = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Άρα } \vec{\alpha} = \left(|\vec{\beta}|, \frac{|\vec{\alpha}|}{\sqrt{2}}\right) = (2, 2).$$

Γ2. Για τα σημεία A και E ισχύει $A(2, 2)$, $E(2, 0)$ και το K μέσο του AE άρα

$$\begin{cases} x_K = \frac{x_A + x_E}{2} \\ y_K = \frac{y_A + y_E}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_K = \frac{2+2}{2} \\ y_K = \frac{2+0}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_K = 2 \\ y_K = 1 \end{cases}$$

Επομένως $K(2, 1)$ άρα $\overrightarrow{OK} = (2, 1)$

Για το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχουμε:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A) \Leftrightarrow (2, 0) = (x_B - 2, y_B - 2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_B - 2 = 2 \\ y_B - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 4 \\ y_B = 2 \end{cases}$$

Επομένως $B(4,2)$ άρα $\overrightarrow{OB} = (4,2)$

$$\det(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OK}) = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 0 \text{ άρα } \overrightarrow{OB} // \overrightarrow{OK}$$

και O κοινό σημείο επομένως τα σημεία O, B, K συνευθειακά.

Γ3. Η ευθεία OA έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_{OA} = \frac{y_A - y_O}{x_A - x_O} = \frac{2-0}{2-0} = 1$ και επειδή $(\varepsilon_1) \perp OA$ θα ισχύει $\lambda_{\varepsilon_1} \cdot \lambda_{OA} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon_1} = -1$.

Οπότε η ευθεία (ε_1) διέρχεται από το σημείο $K(2,1)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_{\varepsilon_1} = -1$ άρα θα έχει εξίσωση: $y-1 = -1(x-2) \Leftrightarrow y = -x+3$.

Γ4. Η ευθεία OA έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 1$ και διέρχεται από το σημείο $O(0,0)$ άρα έχει εξίσωση $y = x$.

Άρα το συμμετρικό του K ως προς την $y = x$ είναι το σημείο $K'(1,2)$.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Για τον άξονα $x'x$ ισχύει: $y = 0$ άρα η ευθεία γίνεται:

$$\frac{x}{|\vec{\alpha}|} = 1 \Leftrightarrow x = |\vec{\alpha}| \text{ επομένως } A(|\vec{\alpha}|, 0)$$

Για τον άξονα $y'y$ ισχύει: $x = 0$ άρα η ευθεία γίνεται:

$$-\frac{y}{|\vec{\beta}|} = 1 \Leftrightarrow y = -|\vec{\beta}| \text{ επομένως } B(0, -|\vec{\beta}|)$$

Επειδή το τρίγωνο OAB είναι ισοσκελές ισχύει

$$(OA) = (OB) \Leftrightarrow |x_A| = |y_B| \Leftrightarrow ||\vec{\alpha}|| = |-\vec{\beta}| \Leftrightarrow |\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|$$

Δ2. Μ μέσο του ΟΑ άρα

$$x_M = \frac{x_A + x_O}{2} \Leftrightarrow x_M = \frac{|\vec{\alpha}|}{2} \text{ και } y_M = \frac{y_A + y_O}{2} \Leftrightarrow y_M = 0 \text{ άρα } M\left(\frac{|\vec{\alpha}|}{2}, 0\right)$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας BM είναι:

$$\lambda_{BM} = \frac{y_M - y_B}{x_M - x_B} = \frac{\frac{|\vec{\beta}|}{2}}{\frac{|\vec{\alpha}|}{2}} = 2 \text{ εφόσον από το } \Delta 1 \text{ έχουμε ότι } |\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|$$

Άρα η ευθεία BM έχει εξίσωση

$$y - 0 = 2 \left(x - \frac{|\vec{\alpha}|}{2} \right) \Leftrightarrow y = 2x - |\vec{\alpha}| \text{ ή } y = 2x - |\vec{\beta}|$$

Δ3. Κάθε σημείο της μεσοκάθετου ενός ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του. Θα βρούμε την μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος AB.

Ισχύει: $\lambda_{AB} = \frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{\alpha}|} = 1$

Έστω (ζ) η μεσοκάθετος τότε $(\zeta) \perp AB \Leftrightarrow \lambda_{AB} \cdot \lambda_{\zeta} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{\zeta} = -1$

Έστω Λ το μέσο του AB, τότε
$$\begin{cases} x_{\Lambda} = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_{\Lambda} = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{\Lambda} = \frac{|\vec{\alpha}|}{2} \\ y_{\Lambda} = -\frac{|\vec{\beta}|}{2} \end{cases}$$

άρα $\Lambda\left(\frac{|\vec{\alpha}|}{2}, -\frac{|\vec{\beta}|}{2}\right)$ ή $\Lambda\left(\frac{|\vec{\alpha}|}{2}, -\frac{|\vec{\alpha}|}{2}\right)$

Επομένως (ζ): $y - y_{\Lambda} = \lambda_{\zeta}(x - x_{\Lambda}) \Leftrightarrow y + \frac{|\vec{\alpha}|}{2} = -x + \frac{|\vec{\alpha}|}{2} \Leftrightarrow y = -x$

Δ4. Η ευθεία (η): $(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})x - |\vec{\alpha}|^2 y + 2019|\vec{\alpha}|^2 = 0$ έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda_{\eta} = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}|^2}$$

Εφόσον οι ευθείες (η), (ε) είναι κάθετες τότε έχουμε:

$$(\eta) \perp (\epsilon) \Leftrightarrow \lambda_{\eta} \cdot \lambda_{\epsilon} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{\eta} = -1 \Leftrightarrow \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}|^2} = -1 \Leftrightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}|^2 \Leftrightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \Leftrightarrow \vec{\alpha} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$$